



سیکس یعنی جنسی فعل کے ذریعے
لگنے والے انفیکشنز (STIs) کو
سمجھنا

آج ہم ان موضوعات پر بات کریں گے...



- ✓ آپ کو STIs کے متعلق کیا معلوم ہونا ضروری ہے
- ✓ لوگوں کو STIs کیسے لگتے ہیں اور ان کی علامات کیا ہو سکتی ہیں
- ✓ کن لوگوں کو ٹیسٹ کروانا چاہیے
- ✓ ٹیسٹ کہاں اور کیسے کروایا جا سکتا ہے
- ✓ STIs کے علاج کے طریقے
- ✓ STIs کی روک تھام
- ✓ اپنے STIs کے متعلق دوسروں کو بتانا
- ✓ مدد اور سہارا حاصل کرنا





STIs سے مراد سیکس یعنی جنسی فعل کے ذریعے لگنے والے انفیکشنز ہیں:

- STIs سے مراد بیکٹیریا، وائرسوں اور طفیلی اجسام (پیراسائٹس) کی وجہ سے لگنے والے انفیکشنز ہیں۔
- آسٹریلیا میں بیکٹیریا کی وجہ سے لگنے والے STIs زیادہ عام ہیں

STIs اس لیے اہم ہیں کہ:

- STIs کا علاج ہو سکتا ہے اور کچھ سے مستقل شفا ہو سکتی ہے
- علاج نہ کروانے کی صورت میں یہ صحت کے شدید مسائل پیدا کر سکتے ہیں
- STIs رکھنے والے بہت سے لوگوں کو اس بارے میں پتہ نہیں ہوتا اور اس طرح ان سے دوسروں کو یہ انفیکشن لگتا ہے اور انفیکشن پھیلتا جاتا ہے



باقاعدگی سے ٹیسٹ کروانے رہنا اہم ہے تاکہ کوئی STI ہونے کی صورت میں آپ کو پتہ چل جائے۔

STIs سے کیا مراد ہے اور

یہ کیوں اہم ہیں؟



کونسے STIs زیادہ عام ہیں؟

پیراسائٹس کی وجہ سے ہونے والے STIs

- Trichomoniasis (trich)
- جنسی اعضا کے گرد بالوں میں جوئیں (scabies)

وائرسوں کی وجہ سے ہونے والے STIs

- mpox (منکی پاکس)
- human immunodeficiency virus (HIV)
- جینیٹل ہرپیز (جنسی اعضا پر چھالے)
- جینیٹل وارٹس (جنسی اعضا پر مسے)
- ہیپاٹائٹس بی

بیکٹیریا کی وجہ سے ہونے والے STIs

- سفلس (آتشک)
- کلامیڈیا
- گونوریا (سوزاک)

آسٹریلیا میں عام ترین STIs کلامیڈیا، گونوریا اور سفلس ہیں۔

لوگوں کو STIs کیسے لگتے ہیں؟




حمل اور بچے کی پیدائش کے
دوران اور ماں کا دودھ پینے سے



جلد کے جلد کو بھرپور انداز
میں چھونے سے



مرد کے نطفے، وجائنا کی
رطوبتوں، چھاتی کے دودھ یا
خون جیسی جسمانی رطوبتیں
شیئر کرنے سے



وجائنا (عورت کا فرج)، منہ یا
مقعد (پچھلے سوراخ) کے راستے
سیکس کے دوران

آپ کو ان طریقوں سے STIs نہیں لگ سکتے...



خشک ہونٹوں سے کسی
کے خشک ہونٹوں کو
چومنا



ہاتھ ملانا



دوسروں کے استعمال
میں آنے والا شاور یا
سوئمنگ پول استعمال
کرنا



دوسروں کے استعمال
میں آنے والی ٹائلٹ سیٹ
استعمال کرنا



کھانے اور پینے کی چیزیں یا
برتن شیئر کرنا

سِفلس کی عام علامات کیا ہیں؟

✓ منہ، مردانہ عضو تناسل، وجائنا، مقعد یا سرویکس (بچے دانی کی گردن) پر

زخموں جیسی پھنسیاں

✓ ہاتھوں، کمر، سینے یا پیروں پر سرخ دانے

✓ بغلوں یا رانوں اور پیٹ کے درمیانی حصوں میں سوچے ہوئے غدود

✓ بخار

✓ بال گرنا

✓ سر میں درد

✓ تھکن

علاج کے بغیر سِفلس شدید
مسائل کا سبب بن سکتا ہے



کلامیڈیا اور گونوریا (سوزاک) کی عام علامات

- ✓ مردانہ عضو تناسل/پیشاب کی نالی اور وجائنا سے مواد نکلنا
- ✓ پیٹ سے نیچے کے اعضا میں درد
- ✓ وجائنا سے خون آنا
- ✓ پیشاب کرتے ہوئے درد
- ✓ سیکس کے دوران یا بعد میں درد
- ✓ خصیوں (ٹیسٹیکلز) میں درد
- ✓ مقعد میں درد یا مقعد سے مواد نکلنا
- ✓ پاخانہ کرتے ہوئے درد



STIs کی موجودگی کا پتہ چلانے کا واحد طریقہ
باقاعدگی سے ٹیسٹ کروانا ہے۔

کن لوگوں کو STI ٹیسٹ کروانا چاہیے؟

ان صورتوں میں اپنا ٹیسٹ کروانے پر غور کریں:

اکثر ٹیسٹ کرواتے رہنا آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے



یا آپ کے سیکس پارٹنر میں کوئی علامت ہے (لیکن زیادہ تر STIs کی کوئی علامات ظاہر نہیں ہوتیں)



آپ کو پچھلے 12 مہینوں میں کوئی STI رہ چکا ہے



آپ حاملہ ہیں یا حاملہ ہونے کا ارادہ رکھتی ہیں



آپ ایسے مرد ہیں جو مردوں کے ساتھ پروٹیکشن کے بغیر سیکس کرتے ہیں



آپ نے کنڈوم کے بغیر/ (پروٹیکشن کے بغیر) سیکس کیا ہو


STIs کے لیے کن قسموں کے ٹیسٹ موجود ہیں؟

کلامیڈیا گونوریا



- پیشاب کا نمونہ
- وجائنا، مقعد یا گلے سے لیا ہوا سواب

سِفلِس



- خون کا ٹیسٹ
- السر یا زخم نما پھنسی سے لیا ہوا سواب

STIs کی موجودگی کا پتہ چلانے کا واحد طریقہ باقاعدگی سے ٹیسٹ کروانا ہے۔



آپ ان جگہوں پر STI ٹیسٹ کروا سکتے ہیں:

✓ ڈاکٹر یا جنرل پریکٹیشنر (جی پی)


✓ NSW - NSW Sexual Health Clinics سیکسوئل ہیلتھ کلینکس

✓ Family Planning Centres - فیملی پلاننگ سنٹرز

STIs کا ٹیسٹ کہاں سے

کروایا جا سکتا ہے؟

STI ٹیسٹنگ بہت کم وقت
میں، آسانی سے اور رازداری
سے ہو جاتا ہے۔



STI ٹیسٹنگ: آپ سے کیا پوچھا جا سکتا ہے؟

- ✓ کیا آپ میں کوئی ایسی علامات ہیں جن کی وجہ سے آپ کو فکر ہے؟
- ✓ پچھلی بار آپ نے کب سیکس کیا تھا؟
- ✓ کیا پہلے کبھی آپ کا STI ٹیسٹ ہوا ہے؟
- ✓ کیا آپ مردانہ عضو رکھنے والے لوگوں، وجائنا رکھنے والے لوگوں یا دونوں طرح کے لوگوں کے ساتھ سیکس کرتے ہیں؟
- ✓ STIs آپ کے گلے، مقعد یا جنسی اعضا میں ہو سکتے ہیں۔ کیا آپ کے خیال میں ہمیں ان حصوں میں سے کسی کا ٹیسٹ کرنا چاہیے؟
- ✓ آخری بار آپ نے کنڈوم کے بغیر سیکس کیا تھا؟
- ✓ کیا آپ حمل روکنے کا کوئی اور طریقہ استعمال کرتے ہیں؟
- ✓ کیا آپ نے کبھی اپنی مرضی کے خلاف سیکس کیا ہے؟




STIs کا

علاج کیا ہے؟

سِفلِس (آتشک)، کلامیڈیا اور گونوریا
(سوزاک) سبھی کا علاج اینٹی بائیوٹکس سے
کیا جاتا ہے

دوبارہ انفیکشن
ہونا ممکن ہے۔
اکثر ٹیسٹ کروائے
ریں۔



میں خود کو STIs سے کیسے محفوظ رکھ سکتا/سکتی ہوں؟

خود کو محفوظ رکھنے کا بہترین طریقہ سیف سیکس پر عمل کرنا ہے۔

وجائنا، مقعد، منہ کے راستے سیکس سمیت کسی بھی
قسم کی سیکس کرتے ہوئے کنڈوم یا ڈیم (dam)
استعمال کریں:

- ✓ وجائنا کے راستے سیکس
- ✓ مقعد کے راستے سیکس
- ✓ منہ کے راستے سیکس



کیا میرے لیے کسی کو اپنے STI کے متعلق بتانا ضروری ہے؟



- ✓ قانون آپ کو کسی کو بتانے کا پابند نہیں کرتا
- ✓ آپ جن لوگوں کے ساتھ سیکس کریں، ان کو بتانا اہم ہے
- ✓ آپ معقول احتیاطیں اختیار کرنے کے لیے ذمہ دار ہیں
- ✓ اگر جان بوجھ کر کسی تک انفیکشن پہنچایا جائے تو یہ فوجداری جرم ہے

STIs ہونا بہت عام ہے۔ اس میں شرم کی کوئی بات نہیں ہے۔

ہم نے آج کیا سیکھا ہے؟

درست یا غلط؟

1. STIs صرف ان لوگوں کو ہوتے ہیں جو ایک سے زیادہ لوگوں کے ساتھ سیکس کرتے ہیں۔
2. آپ کسی کو دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ اسے کوئی STI ہے۔
3. آپ کو ٹائٹ سیٹ پر بیٹھنے سے STIs لگ سکتے ہیں۔
4. کنڈوم تمام STIs سے مکمل طور پر محفوظ رکھ سکتا ہے۔
5. STIs صرف وجائنا کے راستے سیکس سے لگ سکتے ہیں۔



مجھے کہاں سے مدد
مل سکتی ہے؟

ڈاکٹر یا جی پی تلاش کرنے کے لیے

www.healthdirect.gov.au/australian-health-services

میڈی کیر کارڈ ہونا
ضروری نہیں ہے

Sexual Health Infolink - جنسی صحت کے متعلق معلومات

کا لنک www.shil.nsw.gov.au or 1800 451 624

Legal services (HALC) - قانونی خدمات

www.halc.org.au or (02) 9492 6540

اطلاع دینے والی
مفت سروس

Let Them Know - انہیں بتائیں

www.letthemknow.org.au



مجھے STIs کے متعلق مزید معلومات کہاں سے مل سکتی ہیں؟

Multicultural HIV & Hepatitis Service - ملٹی کلچرل HIV اینڈ ہیپاٹائٹس
سروس

www.mhahs.org.au

Sexual Health Plus - سیکسوئل ہیلتھ پلس
www.health.nsw.gov.au/sexualhealth

Health Direct - ہیلتھ ڈائریکٹ
www.healthdirect.gov.au/sexually-transmitted-infections-sti

International Student Health Hub - انٹرنیشنل سٹوڈنٹ ہیلتھ ہب
www.internationalstudents.health.nsw.gov.au/sti
(نیپالی، ہندی، تھائی اور مینڈرین زبانوں میں معلوماتی پرچے مہیا ہیں)

Play safe - سیف سیکس کے لیے رہنمائی
www.playsafe.health.nsw.gov.au
(NSW میں نوجوانوں کے لیے جنسی صحت کے متعلق معلومات)

Family Planning Australia - فیملی پلاننگ آسٹریلیا
www.fpnsw.org.au



آپ اپنی زبان میں مدد کہاں سے لے سکتے ہیں؟



اگر آپ کو اپنی زبان میں اپنے ڈاکٹر یا ہیلتھ پرووائیڈر سے بات کرنے کے لیے مدد کی ضرورت ہے۔

✓ Translating and Interpreting Service (TIS) ٹرانسلیٹنگ اینڈ انٹریٹنگ سروس) کو

13 14 50 پر کال کریں

✓ یہ سروس مفت اور رازدارانہ ہے

✓ ریسپشنسٹ سے اپنے لیے مفت انٹریٹربک کرنے کو کہیں

آج ہم نے کیا سیکھا ہے؟

- ✓ زیادہ تر STIs کی کوئی علامات ظاہر نہیں ہوتیں لہذا اپنے آپ میں ایسے انفیکشن کا پتہ چلانے کا بہترین طریقہ ٹیسٹ کروانا ہے۔
- ✓ علاج نہ کروانے کی صورت میں STIs صحت کے شدید مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔
- ✓ STI ٹیسٹنگ بہت کم وقت میں، آسانی سے اور رازداری سے ہو جاتی ہے اور سیکسوئل ہیلتھ کلینکس میں یہ اکثر مفت ہوتی ہے۔
- ✓ باقاعدگی سے ٹیسٹ کرواتے رہیں۔
- ✓ تمام STIs قابل علاج ہیں اور کچھ STIs سے مستقل شفا ممکن ہے۔

سوالات؟

August 2025

یہ وسیلہ تیار کرنے والے:

NSW Multicultural HIV and Hepatitis Service

(MHAHS) mhahs.org.au